

日文版 JAPAN

1. 「白花油」

痛み取り油

2. 出荷：White Flower International Company Ltd.(Taiwan)

3. 薬品資料：

<u>有効成分</u>	<u>用 途</u>
樟脳	外用、痛み止め
薄荷	外用、痛み止め
メチル サリチレート (Methyl Salicylate)	外用、痛み止め

4. 作用：

次の症状より起こした筋肉及び関節の軽い痛みを暫時解消します。

- 一般の腰や背中の痛み
- 関節炎
- 傷
- 鬱血
- 捻り

5. 告 誡

本製品は外用だけに供し、次の個所へは使用しないで下さい。

- 傷口
- 炎症或は破損した皮膚
- 顔
- 当説明に規定されたもの以外の用途

6. 本製品を使用の際は：

- 目や粘膜へ接触しないで下さい。
- 包帯は余りきつく締めないで下さい。

7. 次の状況が発生した際は、すぐ使用を止め、お医者様に相談して下さい。

- 症状がひどくなった。

- 症状が7日間以上続いた。
- 症状の好転した区域が、数日以内に再発作した。
- 皮膚に嚴重な不具合や炎症を起こした。
- 吐き気、むかつき、腹部の不具合や下痢。
- 関節炎に使用した際
- 10日間以上痛みが続いた。
- 充血して赤くなった。
- 患者が12歳以下の子供の場合。

8.本薬品を子供の手が届かない場所へ置き、不注意で飲み込んだ場合は、すぐお医者様の治療を受けて下さい。

9. 用法

大人及び3歳以上の子供:疾患所へ数滴ぬり、軽くこすり、揉んで下さい。

1日には3~4回を越さないで下さい。

3歳以下の子供は使用禁止。お医者様にご相談下さい。

10.その他注意事項

容器の蓋をしっかりと閉めてください

保存所の室温は、15~30℃ (59~89F°)。

11. 補助成份

ユーカリプタス油 (Eucalyptus Oil)

ラベンダー油 (Lavender Oil)

12.主治：

- 湿気疼痛、小児の腹痛。
- 船や車に酔って、腹痛や下痢。
- かゆみとめ、痛み止め、刀傷や切り傷。
- 暑気当たりや眩暈、無名の腫れ物。
- 火傷や傷、蚊や虫に噛まれた。
- 感冒頭痛、突然のショック。