

韓文版 Korea

1. 백화유

진통 오일

2. 제조 : WhiteFlower International Company, Ltd.(Taiwan)

3.약품자료

유효성분

Camphor

박하

Methyl Sallcylate

용도

외용진통

외용진통

외용진통

4.작용:

아래의 증세로 인한 근육과 관절의 아픔을 잠시적으로 가볍게
해줄수있습니다

- 일반적인 허리나 등의 쭉심
- 관절염
- 언어맞거나 부딪친 상처
- 멍듬 상처
- 근육이나 뼈를 삐었을때

5.경고 본제품은 외부용제품으로

사용하지마십시오:

- 상처
- 긁거나 상처입은 피부
- 얼굴에
- 사용안내에 설명치 않은 다른용도

6.본제품 사용시:

- 눈이나 점막에 들어가게 하면 않된다
- 본드를 너무 팽팽하게 감지 않는다

7.아래의 증세가 나타나면 사용을 멈추고 의사의 지시에 따라 주세요:

- 증세가 심해진다
- 증세가 일주일이상 지속된다
- 증세가 좋아지는것 같더니 수일내로 재발이된다
- 피부의 적성에 안맞거나 붉음
- 토하거나 구역질등 배가 불편해지고 설사를 할때
- 관절염에 사용시는:
 - 10 일 이상 아픔이 지속된다
 - 빨게지고 충혈이될때
 - 환자가 12 세 어린이일 경우

8.본약품은 어린이가 손을 닿수없는곳에 보관하도록하며 잘못하여 어린이가 삼키거나 먹었을때는 즉시 의사의 진찰을 받도록한다.

9.용법

어른이나 3 세이상의 어린이 : 환부에 몇방울 떨어뜨리고 손으로 가볍게 문질러 준다.

하루에 3 에서 4 번이상은 사용하지 마십시오

3 세이하의 유아 : 사용하지 마시고 의사의 진찰을 받도록 하십시오.

10.기타주의사항:

용기의 마개를 꼭 닫아주십시오

실내온도 섭시 15 에서 30℃(F℃ 59 에서 89℃)에서 보관해주십시오

11.보조성분

Eucalyptol 오일과 라벤다 오일

12 . 주요치료 :

- | | |
|----------------|--------------|
| ● 류마치스나 근육통 | 어린이의 배탈 |
| ● 배멀미나 차멀미 | 위가아프거나 설사 |
| ● 가려움이나 지통 | 칼에베거나 상처 |
| ● 더위를 먹거나 어지로움 | 곤충등에 물려 부어오름 |
| ● 불에덴상처 | 모기에 물린상처 |
| ● 감기몸살 두통 | 급만성 경풍 |